

El *Canastero de las quebradas* se distribuye principalmente en Perú, y en una restringida sección de Chile (Remsen 2018). Antes se consideraba endémica de Perú, pero van der Gaast (1997) publicó un avistamiento de la especie en Putre. Posteriormente, Torres-Mura (1998), revisando pieles del Museo Nacional de Historia Natural colectadas en 1971 por Kuschel, nota que existen varios ejemplares mal clasificados, y que corresponden a esta especie, confirmando así que la especie es regular en el país. Marín y McFarlane (2002) publican el avistamiento de ejemplares en varios otros sectores de la región: Murmuntani, Belén, Lupica y Ticnamar. En este Atlas encontramos registros por la precordillera desde Putre hasta Chusmiza, en Tarapacá (F. Díaz, R. Barros y F. Schmitt *en eBird* 2010), aunque posteriormente se registró en eBird en Sibaya (J. Figueroa *en eBird* 2018), unos diez kilómetros más al sur.

La distribución altitudinal ha variado levemente en la literatura: Marín y McFarlane (2002) lo ubican entre los 3.100–3.700 MSNM; Jaramillo (2003) lo ubica entre los 3.000–3.600 MSNM y Martínez y González (2004) entre los 3.000–3.700 MSNM. En este Atlas los registros estuvieron entre los 3.000–3.800 MSNM.

El conocimiento sobre su biología reproductiva es muy escaso. Solo se sabe que hay volantones en mayo (Remsen 2018). Por ello, se insta a los observadores de aves a registrar conductas reproductivas para la especie, que probablemente ocurran en los matorrales de la precordillera andina de Arica, y publicarlas o subirlas a eBird. No se conocen amenazas específicas a esta especie, pero aparentemente no se encuentra en riesgo. 🌿

Canastero de las quebradas *Asthenes pudibunda*

Fernando Medrano

RED DE OBSERVADORES DE AVES
Y VIDA SILVESTRE DE CHILE (ROC)

fernandomedranomartinez@gmail.com



METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR

