

## Pato real

### *Mareca sibilatrix*

Daniel Martínez-Piña

EDICIONES DEL NATURALISTA

info@edicionesdelnaturalista.cl


El *Pato real* es una especie propia del sur de Sudamérica, distribuyéndose principalmente en Chile y Argentina, llegando en desplazamientos invernales hasta el sur de Brasil, Uruguay y Paraguay, y presentándose también en las islas Malvinas/Falkland (Fjeldså y Krabbe 1990, Carboneras y Kirwan 2018). En Chile Goodall et al. (1951) lo señalan desde la desembocadura del río Huasco, Región de Atacama, hasta Tierra del Fuego, Región de Magallanes, siendo más abundante de Valdivia al sur, y migratorio en el extremo sur de su distribución, aunque parte de su población permanece en invierno tan al sur como la zona norte de Tierra del Fuego (Clark 1986). Schletter y Riveros (1987) precisan su límite austral en las islas al sur del canal Beagle e islas Diego Ramírez. En cuanto a las altitudes, Jaramillo (2003) lo sitúa entre 0–1.000 MSNM.

Los datos recopilados en el Atlas concuerdan con la distribución conocida para el país, ampliándola un poco hacia el norte, hasta la desembocadura del río Copiapó, Región de Atacama. En el Atlas lo encontramos de forma regular entre los 0–2.400 MSNM, aunque la mayoría de los registros se concentran bajo los 400 MSNM.

El Pato real ocupa gran variedad de humedales, lagos, lagunas, marismas y arroyos o ríos de escasa corriente, en general con vegetación subacuática como *Myriophyllum*, entre otras; también se encuentra en el borde costero. Se observa generalmente en parejas, grupos pequeños o grandes concentraciones en invierno (Barros 1965, Fjeldså y Krabbe 1990, Carboneras y Kirwan 2018).

Su dieta consiste en hierbas y semillas, además de gusanos, larvas y pequeños peces (Housse 1945). Se alimenta principalmente pastando en tierra firme, forrajea en costas marinas, donde consume algas y también consume alimento mientras nada en aguas abiertas, a veces sumergiéndose (Carboneras y Kirwan 2018).

#### METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR



Los machos poseen una voz característica, un silbido trinado que muchas veces emiten en coro. Durante algunos despliegues territoriales el macho, de coloración más vistosa que la hembra, puede erizar las plumas de la nuca (Fjeldså y Krabbe 1990).

Los cortejos comienzan en junio–julio en Chile, con la temporada reproductiva en el centro del país de octubre a diciembre (Carboneras y Kirwan 2018). Goodall et al. (1951) señalan que empieza a nidificar en las provincias centrales a fines de agosto–septiembre, con huevos hasta enero en Magallanes. En el Atlas se registraron despliegues y cópulas entre julio–octubre, nidos activos entre octubre–diciembre, y polluelos entre septiembre–febrero.

Elige para nidificar sitios cercanos a los cuerpos de agua, aunque también sitios secos más distanciados. Esconde el nido en champas de pasto, debajo de cardos, matorrales u otros sitios similares, aunque también en juncos en el borde de lagos. Construye una taza de finas hierbas, cubierta con abundante plumón. La nidada varía entre 5–10 huevos de color blanco cremoso. El cuidado de los polluelos lo realizan ambos padres (Housse 1945, Goodall et al. 1951, Barros 1965).

No se considera globalmente amenazado, sino en «PREOCUPACIÓN MENOR» (BirdLife International 2018). Se encuentra ampliamente distribuido y es bastante común en gran parte de su rango, con una población global estimada en 100.000–1.000.000 individuos (Carboneras y Kirwan 2018). 🌿

