

## Tenca patagónica

*Mimus patagonicus*

Santiago Imberti


ASOCIACIÓN AMBIENTE SUR

santiagoimberty@gmail.com

*Se distribuye* de manera bastante uniforme en toda la estepa patagónica, desde el pie de los Andes y hacia el norte desde el Estrecho de Magallanes, hasta la costa del océano Atlántico, y continuando como una cuña hacia el norte de Argentina en donde existe el ambiente de monte. Presente hasta el norte de este país durante la época reproductiva, se dispersa hacia el centro-este durante el invierno (Ridgely y Tudor 2009, Narosky e Izurieta 2010, de la Peña 2015). Si bien la especie no ha sido detectada en otras regiones de Chile, existen zonas potenciales con ambiente estepario patagónico donde la especie podría estar presente tanto en la Araucanía como en Aysén, áreas que necesitan ser mejor prospectadas. Accidentalmente también podría estar presente en otras zonas limítrofes donde la especie está presente en Argentina.

Si bien los registros en Chile eran mayormente escasos en el pasado, e incluso Hellmayr (1932) señala que se trataría de un error su inclusión en el listado de aves del país, ya Goodall *et al.* (1946) consideran que es mucho más común de lo pensado y que incluso nidificaría en Chile, algo que más adelante se confirmaría (Goodall *et al.* 1964). En todo caso, actualmente se la considera una especie poco común en el país (Jaramillo 2003). En Chile, la Tenca patagónica está mayormente presente en la zona de estepa, en las regiones de Aysén y Magallanes principalmente durante el verano, existiendo algunos registros de la zona central durante el invierno y en el periodo pre y post reproductivos. Aparentemente su presencia en Tierra del Fuego sería de carácter accidental. En este Atlas, se corrobora que la especie se reproduciría solo en las zonas de estepa de la Región de Magallanes y se la registra en Aysén desde el nivel del mar hasta los 1.000 MSNM.

### METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR



Favorece todo tipo de ambientes abiertos y aun aquellos modificados por la mano del hombre, asociándose a establecimientos humanos con frecuencia. Contrario a lo indicado por Jaramillo (2003), no se trata de una especie tímida o susceptible de ser sub-observada, dada su preferencia por perchas expuestas y a su comportamiento, ya que vocaliza con frecuencia, generalmente desde una percha prominente y, en consecuencia es fácilmente detectable.

Nidifica construyendo una especie de tazón de ramas pequeñas que reviste con pastos, raíces pequeñas y otros materiales blandos que pueda encontrar, incluidos desechos como telas e hilos (de la Peña 2015) en un arbusto o pequeño árbol, en ocasiones hasta a dos o tres metros del suelo. La postura es de cuatro a cinco huevos ovoidales verdosos con pintas castañas y grises (de la Peña 2015), entre los meses de septiembre a diciembre.

La población mundial de la Tenca patagónica no ha sido cuantificada pero se considera estable y dado su extenso rango de distribución se la clasifica como «PREOCUPACIÓN MENOR» a nivel mundial (BirdLife International 2018). Las poblaciones de Chile son reducidas y algo restringidas pero no parecen presentar amenazas de conservación significativas dada la adaptabilidad de la especie a ambientes modificados por el hombre. 🌿

